

# Paclitaxel

**Marca comercial:** Taxol, Onxol



El paclitaxel, también conocido como Taxol, pertenece a la clase de medicamentos llamados antineoplásicos. Estos productos desaceleran o detienen la multiplicación de las células cancerosas.

## **Formas de empleo**

---

El paclitaxel fue autorizado por la Administración de Drogas y Alimentos el 4 de agosto de 1997 como tratamiento de segunda línea para el sarcoma de Kaposi relacionado con el SIDA.

## **Presentación/Administración**

---

Se fabrica en líquido administrado en infusión intravenosa.

## **Contraindicaciones**

---

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

## **Posibles efectos secundarios**

---

Además de sus efectos deseables, el paclitaxel puede causar algunos efectos adversos, incluso cansancio o debilidad poco comunes; enrojecimiento de la cara; erupción cutánea o picazón; dificultad respiratoria; fiebre o escalofríos; tos o ronquera; lumbago o dolor lateral; dolor o dificultad al orinar; deposiciones negras con apariencia de alquitrán; hemorragia o hematomas poco comunes; sangre en la orina o la materia fecal; pequeños puntos rojos en la piel; efectos cardíacos, tales como presión baja (hipotensión), baja tensión arterial o anomalías en el electrocardiograma; problemas del hígado; dolor o enrojecimiento del sitio de inyección; aftas en la boca o ampollas en los labios. Los pacientes deben informar al médico si tienen síntomas de cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios del paclitaxel pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre ellos cabe citar dolor de las articulaciones o los músculos, especialmente de los brazos y las piernas; diarrea, náusea y vómito; adormecimiento, quemazón u hormigueo de las manos o los pies; y pérdida del cabello. Los pacientes deben informar al médico si esos efectos

secundarios continúan o son molestos.

## **Interacción con otros medicamentos**

---

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

## **Ensayos clínicos**

---

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Paclitaxel, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en: <http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Paclitaxel AND HIV Infections.

## **Fabricantes**

---

Taxol  
Bristol - Myers Squibb Co  
PO Box 4500  
Princeton, NJ 08543-4500  
(800) 321-1335

Paclitaxel  
Bristol - Myers Squibb Co  
PO Box 4500  
Princeton, NJ 08543-4500  
(800) 321-1335

Onxol  
IVAX Pharmaceuticals Inc.  
4400 Biscayne Blvd  
Miami, FL 33137  
(800) 327-4114

## **Para más información**

---

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este

# ***Paclitaxel***



## **Para más información (cont.)**

---

- al Live Help: [http://aidsinfo.nih.gov/live\\_help](http://aidsinfo.nih.gov/live_help)  
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m.,  
hora del este